

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Домодедовская стоматологическая поликлиника» (ГБУЗ Московской области «ДСП»)		СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА		НОМЕР:	CX-031
				ЛИСТ:	1
				ВСЕГО:	1
Безопасная подготовка и выполнение инъекции			Хирургическая стоматология		Редакция №2
ДЕЙСТВУЕТ С:	С даты утверждения	СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРЕСМОТР: Не позднее 3 лет	ОСНОВАНИЕ: приказ № 78-СОП от 17.07.2026 (ред. 19.10.2026)		
ДАТА РЕДАКЦИИ: 19.10.2026					
РАЗРАБОТАЛ: Врач-стоматолог-хирург А. Ф. Шарганов			СОГЛАСОВАНО: Главная медицинская сестра В. В. Шаргель		
ПРОВЕРИЛ: Исполняющий обязанности заместителя главного врача по лечебной работе В. В. Савилов			УТВЕРДИЛ: Главный врач М. М. Каюгин		

Назначение и условия

Дополняет CX-009 правилами защиты от перекрёстного инфицирования. Клинический выбор и дозу определяют по CX-032, а обработку многоразового шприца — по существующим инфекционным СОП.

Ответственность — врач отвечает за диагноз, решение, согласие и медицинскую запись; ассистент за подготовку, проверку и передачу; руководитель за оснащение, назначенных исполнителей и практический допуск.

Порядок выполнения

1. Подготовить лекарство в чистой зоне, выполнить гигиену рук, проверить упаковку, целостность, прозрачность, срок и серию. Не располагать чистые карпулы среди использованных инструментов.
2. Сверить пациенту препарат, концентрацию, эпинефрин, объём и планируемую дозу. Ассистент выполняет независимую проверку по карточке; врач отвечает за выбор и предел.
3. Использовать новую стерильную иглу и карпулу для одного пациента. Многоразовый карпульный шприц перед каждым пациентом обработать и стерилизовать по инструкции; смена иглы не заменяет обработку шприца.
4. Пробку карпулы обрабатывать способом, совместимым с инструкцией препарата/изделия. Не погружать карпулу в неразрешённый раствор, не использовать повреждённую упаковку.
5. Вводить препарат по освоенной технике и инструкции с аспирационным контролем и наблюдением. При смене препарата снова сверить маркировку и накопленную дозу.
6. Остаток открытой карпулы не использовать у другого пациента и не сохранять для следующего приёма. Завершить безопасной утилизацией иглы и передачей шприца на обработку.

Остановка и повышение уровня помощи

Неопределённая маркировка, загрязнение, дефект, просроченный препарат или отсутствие стерильного шприца. При реакции — CX-001.

Запись и проверка навыка

Препарат, серия, объём и доза, место/время введения, эффект и отклонения. При нарушении асептики — запись и разбор.

Продемонстрировать сборку и смену пациента. Критическая ошибка — повторное использование карпулы или шприца без стерилизации.

Условия применения и основания

Инструкции фактического карпульного шприца и средства обработки пробки.

CDC Dental IPC Safe Injections. <https://www.cdc.gov/dental-infection-control/hcp/dental-ipc-faqs/safe-injections.html>

Связанные формы и записи

Медицинская карта пациента; Хирургический чек-лист удаления зуба, имплантации или другого вмешательства.