

Стандартная операционная процедура (СОП) 011

ВЫБОР И БЕЗОПАСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОЖНОГО АНТИСЕПТИКА

Введена в действие с 17.07.2026.

Действует до замены новой редакцией; плановый пересмотр не позднее 17.07.2029.

Область применения: Все подразделения, применяющие кожные антисептики

1. Цель

Исключить применение антисептика не по назначению и обеспечить выбор зарегистрированного средства по области применения, инструкции, спектру действия и совместимости.

2. Ответственность

- Главная медицинская сестра организует утверждение перечня разрешённых средств, наличие инструкций и контроль сроков годности.
- Ответственный за инфекционную безопасность проверяет соответствие назначения, режима и локальных схем действующим требованиям.
- Сотрудник перед применением сверяет этикетку, назначение, срок годности, целостность и экспозицию.
- Заведующие подразделениями обеспечивают обучение и наличие инструкции у места применения.

3. Признаки и условия применения

- Выбор выполняют отдельно для: гигиенической обработки рук; хирургической обработки рук; кожи инъекционного/операционного поля; слизистых оболочек; поверхностей и оборудования.
- Средство допускается только при наличии государственной регистрации, маркировки и инструкции, разрешающей конкретную область применения.
- Состав средства сам по себе не заменяет проверку инструкции: одинаковое действующее вещество может иметь разные концентрации, экспозицию и разрешённые области.

4. Порядок выполнения

1. Определить объект обработки: руки, неповреждённая кожа пациента, слизистая, поверхность или оборудование.
2. Выбрать средство из утверждённого локального перечня, у которого инструкция прямо разрешает нужный объект и режим.
3. Проверить срок годности, целостность упаковки, название, концентрацию, экспозицию, необходимость предварительного очищения и ограничения производителя.
4. Для слизистой полости рта использовать только средство, инструкция которого прямо разрешает применение на слизистых; кожный антисептик автоматически для этого не подходит.
5. Для гигиенической и хирургической обработки рук применять разные утверждённые режимы по СОП 009 и 010 и инструкции средства.
6. Для инъекционного/операционного поля обработать требуемую площадь и выдержать полное время экспозиции; спиртосодержащему средству дать полностью высохнуть до электрокоагуляции, лазера или иного источника воспламенения.
7. Не смешивать средства, не доливать новое средство в остаток, не переливать в немаркированную ёмкость. При допустимом многократном дозаторе соблюдать утверждённый порядок его замены/обработки.
8. При раздражении, химическом повреждении, ошибочном применении или несоответствии маркировки прекратить использование, оказать помощь, изолировать флакон и зарегистрировать событие.

5. Стоп-сигналы и безопасность

- Не применять средство вне области, прямо указанной в инструкции, и не заменять кожным антисептиком средство для поверхностей или слизистых.
- Не сокращать экспозицию и не наносить спиртосодержащее средство рядом с источником воспламенения до полного высыхания.
- Не использовать просроченную, повреждённую, немаркированную или перелитую в неизвестную ёмкость продукцию.
- Не смешивать антисептики и не ориентироваться только на торговое название или запах.

6. Документирование и контроль

- В локальном перечне фиксируют торговое название, регистрационные данные, объект, режим, экспозицию, срок годности и место применения.
- Контроль включает аудит маркировки, сроков, инструкций у места применения и соответствия фактического режима.

- Нежелательную реакцию или ошибку применения регистрируют по СОП П11-01; подозрение на неблагоприятное событие с изделием — по СОП П4-02.

7. Связанные документы и источники

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
- МУ 3.5.1.3674-20 «Обеззараживание рук медицинских работников и кожных покровов пациентов при оказании медицинской помощи».
- СОП 009 «Гигиеническая обработка рук» и СОП 010 «Хирургическая обработка рук».
- Инструкция и регистрационные документы конкретного средства; утверждённый локальный перечень антисептиков.

Правило применения. При расхождении настоящего СОП с действующей клинической рекомендацией, инструкцией лекарственного препарата или медицинского изделия применяют актуальный источник, а СОП направляют на внеплановый пересмотр.

Краткий алгоритм у рабочего места

Шаг	Действие
1	Что обрабатываем: руки / кожа / слизистая / поверхность?
2	Инструкция прямо разрешает этот объект и режим?
3	Срок, маркировка, концентрация и экспозиция проверены?
4	Спиртовое средство полностью высохло до источника возгорания?
5	Не смешивать, не доливать, не переливать без маркировки.

И

лист документа

Роль	Дол.	Подпись	Дата
Утвердил	Главный врач / М. М. Каюгин		
Разработал	И. о. заместителя главного вр		
Оформил	Ответственный за ведение до		
Рассылка	Все подразделения, применяк		
Изменение	По приказу и с заменой контрольных экземпляров		
Место хранения	Контрольный экземпляр — у ответственного за СМК		
Количество экземпляров	По реестру контролируемых копий		
Согласование	Главная медицинская сестра / В. В. Шаргель		
Согласование	Ответственный за инфекционную безопасность		
Согласование	Заведующий подразделением по месту применения		

Лист ознакомления

№	Ф. И. О.	Должность	Дата	Подпись
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				