


 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Домодедовская стоматологическая поликлиника» (ГБУЗ МО ДСП)		СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА		НОМЕР:	ХБ-05
				ЛИСТ:	1
				ВСЕГО:	3
Ведение пациента, принимающего антикоагулянты или антиагреганты, перед хирургическим вмешательством		Хирургическая стоматология		Редакция №1	
ДЕЙСТВУЕТ С:	Вводится впервые с 17.07.2026	ДАТА СЛЕДУЮЩЕГО ПЕРЕСМОТРА: 17.07.2029	ПРИЧИНА ПЕРЕСМОТРА: Вводится впервые приказом № 78-СОП от 17.07.2026		
ЗАМЕНЯЕТ: —					
СОСТАВИЛ: Врач-стоматолог-хирург А. Ф. Шарганов					
ПРОВЕРИЛ: И. о. заместителя главного врача по лечебной работе В. В. Савилов		УТВЕРДИЛ: Главный врач М. М. Каюгин		 	

Область применения: Хирургическая стоматология

1. Цель

Сбалансировать риск кровотечения и риск тромбоза без самовольной отмены жизненно важной терапии.

2. Ответственность

- оперирующий врач собирает сведения и планирует гемостаз
- назначивший препарат специалист участвует при высоком риске
- пациент не меняет лечение без согласованного решения

3. Обязательные записи

- медицинская карта пациента или профильный журнал процесса
- чек-лист либо запись о выполненных контрольных действиях
- сообщение о нежелательном событии или несоответствии при его возникновении
- наименование, доза, показание и время последнего приёма антитромботического препарата
- согласованный план при необходимости

4. Порядок выполнения

1. Уточнить точное наименование препарата, дозу, режим, показание, время последнего приёма, функцию почек/печени, другие лекарства и наличие комбинированной терапии.
2. Определить риск кровотечения процедуры по Приложению 5 к приказу № 23-ХБ; запланировать раннее время, этапность, наблюдение, упаковку и швы по риску.
3. Не отменять и не снижать препарат автоматически. При протезированном клапане, коронарном стенте, тромбозе/эмболии менее трёх месяцев назад, кардиоверсии, комбинированной терапии или неясном плане получить письменное решение назначившего специалиста.
4. Для варфарина/другого антагониста витамина К проверить МНО: обычно не более чем за 24 часа, при доказанно стабильном МНО — не более чем за 72 часа. При МНО менее 4 лечение проводят без отмены препарата с местным гемостазом; при МНО 4 и выше плановое инвазивное лечение откладывают и связываются с антикоагулянтной службой, срочное направляют на соответствующий уровень.
5. Для прямого орального антикоагулянта при низком риске кровотечения лечение проводят без перерыва. При более высоком риске применяют схему пропуска/отсрочки только по Приложению 5 с учётом препарата, времени дозы и функции почек; повторный приём — не ранее чем через 4 часа после достигнутого гемостаза.

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Домодедовская стоматологическая поликлиника» (ГБУЗ МО ДСП)	СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА	НОМЕР:	ХБ-05
		ЛИСТ:	2
		ВСЕГО:	3
Ведение пациента, принимающего антикоагулянты или антиагреганты, перед хирургическим вмешательством	Хирургическая стоматология	Редакция №1	

6. Один или два антиагреганта самостоятельно не отменяют; при двойной терапии/недавнем стентировании заранее предусматривают более длительный гемостаз, этапность, упаковку и швы.
7. После вмешательства подтвердить устойчивый гемостаз, дать письменные рекомендации и точный план следующей дозы; при повторном кровотечении действовать по СОП ХБ-04 и экстренному маршруту.

5. Стоп-сигналы и повышение уровня помощи

Работу не начинают или немедленно останавливают, если:

- неизвестен препарат или показание
- множественная антитромботическая терапия без согласованного плана
- недавний тромбоз/стентирование/инсульт или высокий риск рецидива
- нет средств для местного гемостаза и наблюдения

6. Контроль выполнения

- нет самовольной отмены препарата
- план учитывает оба риска
- гемостаз и наблюдение документированы

7. Связанные документы и источники

- Приложение 5 к приказу № 23-ХБ от 20.01.2026 в редакции, подтвержденной приказом № 78-СОП от 17.07.2026
- SDCEP. Management of Dental Patients Taking Anticoagulants or Antiplatelet Drugs, 2nd edition, 2022

Правило применения. Конкретные лекарственные препараты, материалы и медицинские изделия применяют по действующей инструкции производителя и индивидуальному клиническому решению врача. При прямом расхождении с действующей клинической рекомендацией применяется актуальная рекомендация, а СОП подлежит внеплановому пересмотру.

Контрольный лист документа

Роль	Должность / Ф. И. О.	Подпись	Дата
Утвердил	Главный врач / М. М. Каюгин		
Разработал	Врач-стоматолог-хирург / А. Ф. Шарганов		
Согласование	И. о. заместителя главного врача по лечебной работе / В. В. Савилов		
Согласование	Главная медицинская сестра / В. В. Шаргель		
Согласование	Заведующий хирургическим отделением / Р. П. Кириллов		

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Домодедовская стоматологическая поликлиника» (ГБУЗ МО ДСП)	СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА	НОМЕР:	ХБ-05
		ЛИСТ:	3
		ВСЕГО:	3
Ведение пациента, принимающего антикоагулянты или антиагреганты, перед хирургическим вмешательством	Хирургическая стоматология	Редакция №1	

Лист ознакомления

№	Ф. И. О.	Должность	Дата	Подпись
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				